

单选

1. Morse 评估单 \geq (B) 分，每班床旁交接，并填写评估单

A. 50

B. 51

C. 60

D. 61

2. 小剂量多巴胺 ($<10\mu\text{g}/\text{min}\cdot\text{kg}$) 的作用不包括 (D)

A. 扩张肾动脉

B. 增加心排量

C. 增加心肌收缩力

D. 收缩肠系膜动脉

E. 兴奋 β_2 肾上腺素受体和多巴胺受体

3. 下面哪项不是健康教育存在的问题 (B)

A. 缺乏个性化健康教育

B. 病人需要什么教什么

C. 健康教育时机把握不当

D. 健康教育缺乏系统性

4. 新型冠状病毒灭活途径不包括 (B)

A. 对紫外线和热敏感， 56°C 加热 30 分钟能有效灭活病毒

B. 可以用洗必泰(氯己定)消毒，能有效灭活病毒

C. 75%乙醇能有效灭活病毒

D. 含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂能有效灭活病毒。

E. 乙醚能有效灭活病毒

5. 下面哪项不是护士为病人进行健康教育的适宜时机 (B)

A. 晨护时

B. 病人睡觉时

C. 静脉输液时

D. 导尿时

6. 脑复苏时采取低温措施的主要目的是 (A)

A. 降低脑细胞需氧量

B. 减轻心律失常

C. 降低肌张力

D. 防止患者烦躁

E. 维持血液渗透压的正常

7. 李某，女，2月 体温 38.3℃，新型冠状病毒核酸阳性，影像学显示双侧或多肺叶浸润，静息状态下，血氧饱和度 (SP02) \leq 93%. 出现呻吟、三凹症，请问李某的临床分型是 (C)

A. 轻型

B. 普通型

C. 重型

D. 危重型

E. 较轻型

8. 下面健康教育的形式不确切的是 (A)

A. 演讲

- B. 一对一讲述
- C. 分发健康小册子
- D. 知识讲座

9. 疑似或确诊新冠肺炎患者医疗废物的管理错误是 (A)

- A. 潜在污染区和污染区产生的医疗废物，在离开污染区前应当对包装袋表面采用 500mg/L 的含氯消毒液喷洒消毒（注意喷洒均匀）或在其外面加套一层医疗废物包装袋。
- B. 医疗废物达到包装袋 3/4 时，应当有效封口，确保封口严密，使用双层包装袋盛装医疗废物，采用鹅颈结式封口，分层封扎。
- C. 盛装医疗废物的包装袋和利器盒的外表面被感染性废物污染时，应当增加一层包装袋。
- D. 患者产生的生活垃圾与医疗废物均作为医疗废物处理。
- E. 更换医疗废物袋前应仔细检查，确保包装袋无破损、渗漏。

10. 实习、进修人员发生的护理缺陷或安排护理员进行其职责范围外的护理操作中发生的护理缺陷，由 (B) 承担责任。

- A. 实习、进修人员
- B. 带教者

C. 护理员

D. 带教者及安排者

11. PORT 在治疗间歇间应至少每 (D) 维护一次

A. 3 天

B. 1 周

C. 2 周

D. 4 周

12. 新冠病毒的主要传染源是感染的患者和无症状感染者，在潜伏期既有传染性，发病后 (A) 天内传染性较强

A. 5 天

B. 7 天

C. 10 天

D. 12 天

E. 14 天

13. 护理健康教育的主体是 (D)

A. 病人

B. 家属

C. 医生

D. 护士

14. 哪些岗位的护理人员需要取得特殊岗位资质 (D)

A. 康复科

B. 手术室

C. 介入科

D. 高压氧

E. 中医科

15. 按照医院各科室工作性质，合理配置护理人员，新生儿病区床护比配置正确的是（B）

A. 1:0.4

B. 1:0.6

C. 1:0.8

D. 1:1

E. 1:1.5

16. 病人住院健康教育目标正确的是（D）

A. 尽快适应医院环境，建立遵医行为

B. 提高手术适应能力，减轻术前焦虑

C. 提高术后配合治疗能力，减少并发症

D. 提高住院适应能力，减轻心理负担

E. 提高配合检查和治疗能力，减轻焦虑

17. 关于护理查房制度说法正确的是（B）

A. 护理行政查房由总护士长主持，各病区护士长参加，每月2次

B. 护理业务查房的主要对象有新收危重患者，压疮超过评分标准的患者，潜在安全意外事件高危患者

C. 护理业务查房无需护理部主任参加

D. 按照护理教学查房规范，每两月进行一次临床带教查房

18. 质控检查发现病区过期无菌包扣 (D) 分

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

19. 规范患者自带药品的管理与使用，主要是为了保障患者用药的 (A)。

A. 安全

B. 有效

C. 经济

D. 适当

20. 临床科室及相关科室根据 (C) 制定相应的急救药品目录 (含抢救车内备用药品)。

A. 护理部要求

B. 药学部要求

C. 临床需要

D. 医务科要求

21. 临床科室及相关科室首次备用急救药品，应根据临床需求向 (A) 提出书面申请。

A. 药品调剂科

B. 护理部

C. 医务科

D. 信息科

22. 病区固定的急救药品如出现破损或过期现象，应如何处理（ D ）。

A. 自行销毁

B. 丢入垃圾桶

C. 交回护理部

D. 交回药房

23. 使用注射泵时，不宜使用的注射泵规格是：（A）

A. 5ml

B. 20ml

C. 30ml

D. 50ml

24. 在以下心电监护滤波方式中，哪一种最能真实反映病人的心电生理信息（ A ）

A. 诊断

B. 监护

C. 手术

D. ST 分析

25. 应用微量注射泵的主要目的不包括（ D ）

A. 准确控制输液速度

B. 使药物速度均匀、用量准确

C. 便于精确调节用量

D. 增加患者经济负担

26. 微量注射泵常用于治疗下列疾病，（ D ）除外

A. 糖尿病昏迷

B. 休克

C. 肿瘤的化疗

D. 需要肠内营养时

27. 紫外线消毒灯管应使用 75%的酒精（ B ）时间擦拭一次。

A. 5天

B. 7天

C. 14天

D. 以上都不对

28. 医院感染暴发是指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生（ B ）以上同种同源感染病例的现象。

A. 2例

B. 3例

C. 4例

D. 5例

29. 近距离接触经空气传播或飞沫传播的呼吸道传染病患者时应戴哪种口罩？（ D ）

A. 纱布口罩

B. 一次性医用口罩

C. 外科口罩

D. 医用防护口罩

30. 控制医院感染最简单、最有效、最方便、最经济的方法是：（ C ）

A. 环境消毒

B. 合理使用抗菌素

C. 手卫生

D. 隔离传染病人

多选

1. 下列哪项不是优质护理服务主题的是（BCDE）

A. 夯实基础护理、提供满意服务

B. 强化基础护理、深化会内涵

C. 强化基础护理、提供护理质量

D. 夯实基础护理、提升护理队伍的职业形象

E. 夯实基础护理、提升护理管理

2. 人工气道气囊的作用有哪些（BCD）

A. 防止气道粘膜损伤

B. 预防误吸

C. 固定人工气道

D. 保证正压通气

3. 高警示药品的管理要求（ABCD）

- A. 定基数管理
- B. 加锁管理
- C. 标识清楚醒目
- D. 定期检查、核对，账目相符

4. 下列给药制度说法中错误的是（CD）

- A. 护士必须严格根据医嘱给药，不得擅自更改，对有疑问的医嘱，再次询问核对后方可给药，避免盲目执行
- B. 做治疗前，护士要按手卫生的要求洗手、戴帽子、口罩，严格无菌操作规程
- C. 治疗后所用的各种物品进行分类后，可由科室自行消毒处理
- D. 安全正确用药，合理掌握给药时间、方法，药物可提前配制

5. 新型冠状病毒感染患者出院标准（ABDE）

- A. 呼吸道症状明显好转
- B. 肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善
- C. 体温恢复正常 2 天以上
- D. 连续两次呼吸道标本核酸检测阴性（采样时间至少间隔 24 小时）
- E. 体温恢复正常 3 天以上

6. 口服药发放管理要求（ABC）

- A. 按时发放
- B. 按顿发放
- C. 发药到口
- D. 患者不在给隔壁床患者留下

7. PVC 穿刺部位的选择 (ABCDE)

- A. 不宜选择有血栓的静脉
- B. 成人不宜选择下肢静脉
- C. 小儿不宜首选头皮静脉
- D. 腋下淋巴结清扫术应选择健侧的静脉
- E. 宜选择上肢，避开静脉瓣、关节部位及炎症、疤痕、硬结等

8. 关于呼吸机气道高压报警的原因正确的是 (ABC)

- A. 支气管痉挛
- B. 气道内痰液粘稠
- C. 气管套管位置不当
- D. 气囊漏气

9. 新冠疑似病例的临床表现中包含哪些 (ABD)

- A. 发热/或呼吸道症状
- B. 淋巴细胞计数增多
- C. 发病早期白细胞总数正常或降低
- D. CT 检查早期呈现多发小斑片影及间质改变
- E. 淋巴细胞减少，白细胞降低

10. 下面哪类患者有跌倒坠床的危险？（ABCDE）

- A. 步态不稳者
- B. 头晕、眩目、血压不稳者
- C. 精神障碍者
- D. 手术后康复训练的患者
- E. 低钾低钠血症的患者

11. 优质护理要求住院病人“四无”指的是（ABCD）

- A. 无压疮
- B. 无烫伤
- C. 无坠床
- D. 无护理并发症发生 E. 无并发症发生

12. 护理人员上班时不符合规范要求的是（ABCD）

- A. 在工作区域聊天
- B. 在工作区域玩手机
- C. 对患者的询问不理睬
- D. 在工作区域打闹、会友

13. 以下关于高警示药品的管理，正确的是（BCD）

- A. 不需要建立高警示药品目录
- B. 单独存放，不得混放
- C. 警示标识醒目
- D. 取药前准确四查十对

14. 住院病区原则上不存放高警示药品，如确有需要应做到

(ABCD)

- A. 高警示药品清单
- B. 单独存放
- C. 统一标识
- D. 使用时双人核对

15. 以下哪些是监护仪血氧监测的注意事项 (ABC)

- A. 不能长时间对同一部位进行测量
- B. 慎重选择 SP02 的报警上限
- C. 不可高压或浸泡消毒
- D. 附件损坏不影响继续使用

16. 心电粘贴皮肤处理说法正确的是: (ABCD)

- A. 剔除电极安放处的体毛。
- B. 轻轻的摩擦电极安放处的皮肤，以去除死去的皮肤细胞。
- C. 用肥皂水彻底清洗皮肤 (不可使用乙醚和纯酒精，因为这会增加皮肤的阻抗)。
- D. 安放电极前，让皮肤完全干燥。

17. 对 NIBP 袖套绑定描述正确的是: (ABCD)

- A. 确认袖套已经完全放气，然后捆绑在病人上臂或大腿上。
- B. 将袖套安放在病人的上臂或大腿上，并保证记号 Φ 正好位于动脉上。
- C. 确认袖套缠绕肢体不是太紧，否则可能引起肢体变色甚至缺血。

D. 袖套的边缘应位于标识的范围内，否则应更换袖套

18. 引起医院感染传播的主要环节（ ABD ）

A. 感染源

B. 传播途径

C. 免疫力

D. 易感人群

19. 标准预防是医院所有患者和医务人员采取的一组预防感染措施。包括（ ABCD ）

A. 手卫生

B. 个人防护用品的使用

C. 安全注射

D. 穿戴 PPE 正确处理患者环境中污染的物品与医疗器械

20. 手卫生包括（ ABC ）

A. 洗手

B. 卫生手消毒

C. 外科手消毒

D. 以上均不对