

## 单选

1. 我院护理管理构架体系 (A)

- A. 院-科部-病区
- B. 护理部-病区
- C. 科部-病区
- D. 病区-科部-院
- E. 病区-科部

2. 医用防护口罩的效能持续应用时间 (B)

- A. 4 小时
- B. 6-8 小时
- C. 大于 8 小时
- D. 4-6 小时
- E. 6 小时

3. 对患者进行压力性损伤活动评估能力时, 患者局限于轮椅活动, 没有行走能力, 其活动能力评分为 (B)

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

4. 输液治疗的感染控制和护理安全描述错误的是 (D)

A. 输液治疗时必须严格执行无菌技术操作规程，执行标准预防措施

B. 使用手套不能代替洗手

C. 为减少针刺伤的发生，选用防针刺伤的穿刺器具

D. 消毒剂用无菌棉签擦拭干净方可穿刺

5. 血小板输注时间应 (A)，一般为每分钟 80-100 滴

A. 快

B. 慢

C. 无特殊要求

D. 随意

6. 下列关于交接班制说法错误的是 (C)

A. 医护人员交接班时必须衣帽整齐，按时交接班，严禁迟到、早退

B. 交接工作要按时进行，接班者应提前 10 分钟到病区

C. 交接班时严格执行查对制度，且接班人员单独应巡视病房

D. 值班者必须在交接前完成本班各项工作，防止遗忘

7. 入院评估单最晚完成的时间应在入院 (D)

A. 4 小时

B. 8 小时

C. 12 小时

D. 24 小时

8. 下列对分级护理要点说法错误的是 (C)

A. 特级护理设专人 24 小时护理，备齐急救药品、器材，随时准备抢救

B. 一级护理每 1 小时巡视患者，观察患者病情变化

C. 二级护理每 1.5 小时巡视患者，观察患者病情变化

D. 三级护理每 3 小时巡视患者，观察患者病情变化

**9. 什么是密切接触者，下列说法错误的是 (B)**

A. 与病例共同居住、学习、工作的人员

B. 诊疗、护理、探视落实有效防护的人员

C. 病例同室的其他病友

D. 与病例共同乘坐同一交通工具并密切接触者

E. 与病例共同参加聚会的人员

**10. 健康教育的实质是 (B)**

A. 确保健康教育目标的实现

B. 行为干预

C. 确立健康教育的诊断

D. 健康教育的过程

E. 健康教育的效果

**11. 健康教育的最终目的是 (B)**

A. 注重卫生知识灌输

B. 注重知识改变和行为改变

C. 注重计划健康教育的实施

D. 注重教育效果评价

E. 注重环境改善

**12. 预防新冠肺炎措施宣教不包括 (C)**

A. 保持良好的个人及环境卫生. 保持室内通风良好。

B. 勤洗手、戴口罩、公筷制等卫生习惯和生活方式，打喷嚏或咳嗽时应掩住口鼻。

C. 科学做好个人防护，出现呼吸道症状时不需要发热门诊就医。

D. 近期去过高风险地区或与确诊、疑似病例有接触史的，应主动进行新型冠状病毒核酸检测。

E. 有发热、咳嗽、乏力等症状时去发热门诊就诊。

**13. 小剂量多巴胺 (<10ug/min. kg) 的作用不包括 (D)**

A. 扩张肾动脉

B. 增加心排血量

C. 增加心肌收缩力

D. 收缩肠系膜动脉

E. 兴奋  $\beta_2$  肾上腺素受体和多巴胺受体

**14. 下面哪项不是健康教育存在的问题 (B)**

A. 缺乏个性化健康教育

B. 病人需要什么教什么

C. 健康教育时机把握不当

D. 健康教育缺乏系统性

**15. 下面哪项不是护士为病人进行健康教育的适宜时机 (B)**

- A. 晨护时
- B. 病人睡觉时
- C. 静脉输液时
- D. 导尿时

16. 李某，女，2月 体温 38.3℃，新型冠状病毒核酸阳性，影像学显示双侧或多肺叶浸润，静息状态下，血氧饱和度 (SP02) ≤93%. 出现呻吟、三凹症请问李某的临床分型是 (C)

- A. 轻型
- B. 普通型
- C. 重型
- D. 危重型
- E. 较轻型

17. 下面健康教育的形式不确切的是 (A)

- A. 演讲
- B. 一对一讲述
- C. 分发健康小册子
- D. 知识讲座

18. 疑似或确诊新冠肺炎患者医疗废物的管理错误是 (A)

A. 潜在污染区和污染区产生的医疗废物，在离开污染区前应当对包装袋表面采用 500mg/L 的含氯消毒液喷洒消毒（注意喷洒均匀）或在其外面加套一层医疗废物包装袋。

B. 医疗废物达到包装袋 3/4 时，应当有效封口，确保封口严密，使用双层包装袋盛装医疗废物，采用鹅颈结式封口，分层封扎。

C. 盛装医疗废物的包装袋和利器盒的外表面被感染性废物污染时，应当增加一层包装袋。

D. 患者产生的生活垃圾与医疗废物均作为医疗废物处理。

E. 更换医疗废物袋前应仔细检查，确保包装袋无破损、渗漏。

**19. 从血库取回的血液制品应该在多少时间内开始输注 (B)**

A. 20min

B. 30min

C. 15min

D. 60min

**20. 按照医院各科室工作性质，合理配置护理人员，新生儿病区床护比配置正确的是 (B)**

A. 1: 0.4

B. 1: 0.6

C. 1: 0.8

D. 1: 1

E. 1: 1.5

**21. 压力性损伤高危患者提供的护理措施错误的是 (D)**

- A. 使用气垫床
- B. 每 2 H 翻身 1 次
- C. 管理好大小便失禁
- D. 保暖
- E. 床单元平整整洁

**22. 病区护理质控自查及安全自查的频率 (C)**

- A. 每月 2 次、每月 1 次
- B. 每月 1 次、每月 1 次
- C. 每月 2 次、每周 1 次
- D. 每周 1 次、每月 2 次

**23. 使用除颤仪的时候，下列描述正确的是 ( B )**

- A. 除颤仪不必自检，直接使用
- B. 不能用超声耦合剂，只能使用导电膏
- C. 每天都需要主动做检测
- D. 电池报废可以忽视

**24. 哪个是心率起源 ( A )**

- A. 窦房结
- B. 房室结
- C. 房室束
- D. 浦肯野氏纤维

**25. 黄金急救时间是 ( C )**

- A. 10 分钟

B. 6 分钟

C. 4 分钟

D. 8 分钟

26. 以下哪类人员不得独立使用高警示药品（ D ）

A. 实习期护士

B. 实习护士

C. 进修护士

D. 以上三类

27. 高警示药品发放时要进行（ B ）以确保发放准确无误

A. 随意拿取

B. 双人复核

C. 无需核对

D. 自取自对

28. 病区抢救车急救药品常备的药品有（ A ）。

A. 肾上腺素

B. 胰岛素

C. 利多卡因

D. 阿托品

29. 预检分诊、发热门诊与感染性疾病科门诊医务人员应采用（ A ）

A. 一级防护

B. 二级防护

C. 三级防护

D. 以上均不正确

**30. 二级防护适用于医务人员从事与疑似或确诊患者有密切接触的诊疗活动，是指（ A ）**

A. 穿戴一次性工作帽、一次性外科口罩(接触有流行病学史的戴 N95 防护口罩)、工作服、隔离衣,必要时戴一次性乳胶手套

B. 穿戴一次性工作帽、防护眼镜或面罩(防雾型)、医用防护口罩、防护服或隔离衣、一次性乳胶手套,一次性鞋套

C. 穿戴一次性工作帽、戴医用防护口罩、防护面罩(或全面型呼吸防护器或正压式头套)、防护服或隔离衣、一次性乳胶手套,一次性鞋套

D. 以上均不正确

## 多选

### 1. 我院护理质控与安全管理委员会的职责（ABD）

- A. 定期研究护理质量与安全工作
- B. 制定护理质量与安全管理工作计划
- C. 决定科部层面质量管理小组人员名单
- D. 制定护理质量监测指标
- E. 每季度对护理质量与安全管理问题进行分析

### 2. 下列属于高风险药物的有（ABCD）

- A. 10%氯化钾
- B. 胰岛素
- C. C. 肝素钠
- D. 肝素钙
- E. E. 5%葡萄糖注射液

### 3. 危急值报告制度与流程描述正确的是（ACDE）

- A. 医技科室相关人员按照危急值报告流程，及时向临床发出危急值信息
- B. 医护人员接获危急值报告后应记录患者信息、危急值内容，及时向值班医师报告
- C. 医师接到危急值报告后应及时处置并记录
- D. 主管部门对危急值报告有检查与监管
- E. 持续改进有成效，危急值处理及时、记录规范

4. 新型冠状病毒感染病人出院护理的健康宣教不正确的有 (BC)

- A. 选择合适的呼吸康复锻炼方式，摄入高蛋白、含多种维生素和矿物质、高热量饮食
- B. 如无发热、咳嗽、咽痛、胸闷等不适症状无需复诊
- C. 提醒继续进行 28d 隔离医疗观察
- D. 不具备居家隔离条件者，在当地集中隔离点进行 14 天集中隔离医学观察
- E. 有发热、咳嗽、咽痛、胸闷等不适症状立即就诊

5. 下列哪些条件符合申报难免性压力性损伤 (ABCDE)

- A. Braden 评分  $\leq 12$  分
- B 呼吸衰竭、心力衰竭、肝功能衰竭
- C 偏瘫 / 高位截瘫 / 四肢瘫痪
- D 高龄 ( $\geq 70$  岁)、血清白蛋白  $\leq 30$  //L
- E 极度消瘦、高度水肿

6. 住院健康教育包括 ( ABCD )

- A. 入院教育
- B. 手术前教育
- C. 手术后教育
- D. 出院教育
- E. 门诊教育

7. 取血时，出现下列哪些情况不得取回血液制品 (ABCDE)

- A. 血袋标签不清
- B. 血液有凝块
- C. 红细胞层呈紫红色
- D. 血浆呈乳糜状
- E. 血浆呈暗灰色

**8. 下列关于分级护理制度说法错误的是（BCD）**

- A. 特级护理是指病情危重，随时可能发生病情变化需要抢救的患者
- B. 一级护理是指病情稳定仍需卧床且自理能力轻度依赖的患者
- C. 二级护理是指病情趋向稳定的重症患者
- D. 三级护理是指病情处于康复期且自理能力中度依赖的患者

**9. 新型冠状病毒主要传播途径为经（ABCDE）**

- A. 呼吸道飞沫
- B. 密切接触传播
- C. 接触病毒污染的物品也可造成感染
- D. 在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能
- E. 含有病毒的飞沫在物体的表面，接触污染后，用接触的手触摸口腔、鼻腔、眼睛等粘膜导致的感染

**10. 压力性损伤高危患者，在什么情况下，需要 Branden 评**

### 分复评（ABDE）

- A. 癫痫患者使用镇静后
- B. 手术返回病房的患者
- C. 体温 $>38.5^{\circ}\text{C}$ 发热的患者
- D. Branden 评分 $<8$ 分的患者
- E. ICU 转入普通病房的患者

### 11. 护理人员绩效分配基于哪些方面（ABC）

- A. 护理工作数量与质量
- B. 患者满意度
- C. 护理难度与技术要求
- D. 每月护理质量督查结果
- E. 护理部考试考核成绩

### 12. 发生输液反应时,应该（ABCE）

- A. 立即撤除所有液体，更换液体和输液器
- B. 报告主管医生，遵医嘱抢救
- C. 记录患者生命体征及抢救过程及时汇报护士长、主任
- D. 及时丢弃液体
- E. 按要求填写药品不良反应表及不良事件表

### 13. 下列选项正确的是（CD）

- A. 若数个单位的脂肪乳在 1d 内间歇输入，那输液装置没 12h 更换一次

- B. 在输液器没有的情况下，可以考虑用输血器代替输液器
- C. 对输液接头进行消毒时必须要有有一定的擦拭力量
- D. 紫杉醇不能使用 PVC 材质的输液器

14. 如果患者有药物过敏史，应分别在（ ABCDE ）进行标注

- A. 入院评估单
- B. 病区诊断牌
- C. 患者病历牌
- D. 患者床头牌
- E. 患者腕带

15. 保护输液泵的电源线应注意：（ABCDE）

- A. 避免在墙地板与仪器间挤压电源线
- B. 避免在电源线上放重物
- C. 避免电源线放在热源附近
- D. 不用时应拔下电源插头
- E. 电源线损坏时，应及时更换

16. 使用输液泵/注射泵时应评估哪些内容：（ABCDE）

- A. 使用输液泵/注射泵的目的，输入药物的名称，输液速度；
- B. 输液肢体不雅进行剧烈活动；
- C. 不要随意搬动或调节输液泵/注射泵，以保证用药安全；
- D. 如有不适感觉及时通知医护人员；
- E. 机器报警时及时通知医护人员；

17. 以下哪些是属于人工器官的范畴（ABC）

- A. 氧合器
- B. 心脏起搏器
- C. 透析机
- D. 脑电图机

**18. 下列哪项是正确的（ABCD）**

- A. 警示标识牌：贴于高警示药品存放药架、药柜。
- B. 警示标签：小标签，需要时可贴药品外包装上。
- C. 高警示药品标签：显示药品名称、规格。
- D. 高警示药品专用袋：药房发放高警示药品时使用。

**19. 麻醉药品“五专管理”是（ABCDE）**

- A. 专用处方
- B. 专用账册
- C. 专册登记
- D. 专柜加锁
- E. 专人负责

**20. 手卫生包括（ABC）**

- A. 洗手
- B. 卫生手消毒
- C. 外科手消毒
- D. 以上均不对